

## ALERTA A LA POBLACIÓN

**La Pildora del Día Después** que el gobierno ha decretado vender en farmacias sin receta médica tiene los siguientes **efectos secundarios** (como figuran en la ficha técnica del fabricante): náuseas, dolor hipogástrico, sangrado no relacionado con menstruación, depresión, modificaciones del estado de animo y libido, migrañas, palpitaciones, dolor torácico, hipertensión arterial, venas varicosas, exantema, quistes ováricos, nódulos mamarios benignos, secreción mamaria...haciéndola incompatible con su distribución sin control médico.

**Estudios recientes muestran:** náuseas (15%), vómitos (15%), diarreas (3%), fatiga (13%), vértigos o mareos (20%), dolor de cabeza (10%), aumento de la sensibilidad mamaria (8%), dolor abdominal (15%), sangrado vaginal (31%) y retraso de la menstruación (5%) (**The Lancet** 370; 1803, 2002). Se han detectado también **trombosis y embolias**. El Prof. López Guzmán cita también el **riesgo de cáncer de hígado y páncreas y de insuficiencia hepática**. También aumenta la probabilidad de **embarazos extrauterinos, debido al alto índice de fallos de la PDD**.

**El uso repetido de la PDD puede alterar seriamente el ciclo sexual femenino** y ocasionar **esterilidad**. Como ya ha ocurrido en otros países, el uso de la PDD también incrementaría el número de relaciones sexuales, lo que favorecería el **aumento de enfermedades infecciosas de transmisión sexual**. Igualmente se ha documentado el **aumento de los abortos quirúrgicos** por la comercialización de la PDD. La PDD **tiene también un efecto antiimplantatorio cuando se hubiera producido ya la fecundación**, en cuyo caso sería **abortiva**.

[www.unidosporlavida.org](http://www.unidosporlavida.org)

## ALERTA A LA POBLACIÓN

**La Pildora del Día Después** que el gobierno ha decretado vender en farmacias sin receta médica tiene los siguientes **efectos secundarios** (como figuran en la ficha técnica del fabricante): náuseas, dolor hipogástrico, sangrado no relacionado con menstruación, depresión, modificaciones del estado de animo y libido, migrañas, palpitaciones, dolor torácico, hipertensión arterial, venas varicosas, exantema, quistes ováricos, nódulos mamarios benignos, secreción mamaria...haciéndola incompatible con su distribución sin control médico.

**Estudios recientes muestran:** náuseas (15%), vómitos (15%), diarreas (3%), fatiga (13%), vértigos o mareos (20%), dolor de cabeza (10%), aumento de la sensibilidad mamaria (8%), dolor abdominal (15%), sangrado vaginal (31%) y retraso de la menstruación (5%) (**The Lancet** 370; 1803, 2002). Se han detectado también **trombosis y embolias**. El Prof. López Guzmán cita también el **riesgo de cáncer de hígado y páncreas y de insuficiencia hepática**. También aumenta la probabilidad de **embarazos extrauterinos, debido al alto índice de fallos de la PDD**.

**El uso repetido de la PDD puede alterar seriamente el ciclo sexual femenino** y ocasionar **esterilidad**. Como ya ha ocurrido en otros países, el uso de la PDD también incrementaría el número de relaciones sexuales, lo que favorecería el **aumento de enfermedades infecciosas de transmisión sexual**. Igualmente se ha documentado el **aumento de los abortos quirúrgicos** por la comercialización de la PDD. La PDD **tiene también un efecto antiimplantatorio cuando se hubiera producido ya la fecundación**, en cuyo caso sería **abortiva**.

[www.unidosporlavida.org](http://www.unidosporlavida.org)

## ALERTA A LA POBLACIÓN

**La Pildora del Día Después** que el gobierno ha decretado vender en farmacias sin receta médica tiene los siguientes **efectos secundarios** (como figuran en la ficha técnica del fabricante): náuseas, dolor hipogástrico, sangrado no relacionado con menstruación, depresión, modificaciones del estado de animo y libido, migrañas, palpitaciones, dolor torácico, hipertensión arterial, venas varicosas, exantema, quistes ováricos, nódulos mamarios benignos, secreción mamaria...haciéndola incompatible con su distribución sin control médico.

**Estudios recientes muestran:** náuseas (15%), vómitos (15%), diarreas (3%), fatiga (13%), vértigos o mareos (20%), dolor de cabeza (10%), aumento de la sensibilidad mamaria (8%), dolor abdominal (15%), sangrado vaginal (31%) y retraso de la menstruación (5%) (**The Lancet** 370; 1803, 2002). Se han detectado también **trombosis y embolias**. El Prof. López Guzmán cita también el **riesgo de cáncer de hígado y páncreas y de insuficiencia hepática**. También aumenta la probabilidad de **embarazos extrauterinos, debido al alto índice de fallos de la PDD**.

**El uso repetido de la PDD puede alterar seriamente el ciclo sexual femenino** y ocasionar **esterilidad**. Como ya ha ocurrido en otros países, el uso de la PDD también incrementaría el número de relaciones sexuales, lo que favorecería el **aumento de enfermedades infecciosas de transmisión sexual**. Igualmente se ha documentado el **aumento de los abortos quirúrgicos** por la comercialización de la PDD. La PDD **tiene también un efecto antiimplantatorio cuando se hubiera producido ya la fecundación**, en cuyo caso sería **abortiva**.

[www.unidosporlavida.org](http://www.unidosporlavida.org)

## ALERTA A LA POBLACIÓN

**La Pildora del Día Después** que el gobierno ha decretado vender en farmacias sin receta médica tiene los siguientes **efectos secundarios** (como figuran en la ficha técnica del fabricante): náuseas, dolor hipogástrico, sangrado no relacionado con menstruación, depresión, modificaciones del estado de animo y libido, migrañas, palpitaciones, dolor torácico, hipertensión arterial, venas varicosas, exantema, quistes ováricos, nódulos mamarios benignos, secreción mamaria...haciéndola incompatible con su distribución sin control médico.

**Estudios recientes muestran:** náuseas (15%), vómitos (15%), diarreas (3%), fatiga (13%), vértigos o mareos (20%), dolor de cabeza (10%), aumento de la sensibilidad mamaria (8%), dolor abdominal (15%), sangrado vaginal (31%) y retraso de la menstruación (5%) (**The Lancet** 370; 1803, 2002). Se han detectado también **trombosis y embolias**. El Prof. López Guzmán cita también el **riesgo de cáncer de hígado y páncreas y de insuficiencia hepática**. También aumenta la probabilidad de **embarazos extrauterinos, debido al alto índice de fallos de la PDD**.

**El uso repetido de la PDD puede alterar seriamente el ciclo sexual femenino** y ocasionar **esterilidad**. Como ya ha ocurrido en otros países, el uso de la PDD también incrementaría el número de relaciones sexuales, lo que favorecería el **aumento de enfermedades infecciosas de transmisión sexual**. Igualmente se ha documentado el **aumento de los abortos quirúrgicos** por la comercialización de la PDD. La PDD **tiene también un efecto antiimplantatorio cuando se hubiera producido ya la fecundación**, en cuyo caso sería **abortiva**.

[www.unidosporlavida.org](http://www.unidosporlavida.org)